

VitUp!® pravi vitamini **Oligogal® Zn + vitamin C**

kapsule

Dodatak ishrani

Dodatni izvor cinka i vitamina C

| Aktivni sastojci | 1 kapsula | %PDU* |
|-------------------------|------------------|--------------|
| Cink | 15 mg | 150 |
| Vitamin C | 60 mg | 75 |

*PDU-preporučeni dnevni unos

Sastojci: cink-acetat; L-askorbinska kiselina; želatin; kukuruzni škrob; sredstvo protiv zgrudvavanja: silicijum-dioksid; stabilizator: magnezijum-stearat; boje: E 171, E 132 i E 104.

Dejstvo

Cink ima značajnu ulogu kao aktivni sastojak velikog broja enzima koji učestvuju u metabolizmu belančevina, ugljenih hidrata i masti. Neophodan je i za stvaranje hormona insulina kao i za rad imunskog sistema. Potreban je i za rast, deobu i sazrevanje ćelija. Cink ima povoljno dejstvo na funkcije i organe reproduktivnog sistema (jajnici, prostata) kao i na rast kostiju.

Vitamin C i cink su snažni antioksidansi koji mogu da zaštite ćelije i tkiva od oštećenja nastalih kao posledica napada slobodnih radikala. Antioksidantna svojstva cinka i vitamina C mogu da doprinesu jačanju imuniteta, otpornosti i boljem opštem stanju organizma.

Cink i vitamin C mogu i da poboljšaju stanje sluznica i time povećaju njihovu potencijalnu otpornost na spoljašnje činioce koji dovode do nastanka kijavice i prehlade.

Preporučuje se uzimanje kapsula Oligogal® Zn + vitamin C odmah na početku kijavice ili prehlade čime može da se ublaži njihova jačina i trajanje, ojača otpornost i poboljša imunitet.

Način primene

1 kapsula dnevno.

Napomena

Dodaci ishrani se ne mogu koristiti kao zamena za raznovrsnu ishranu.

Upozorenja

Ne sme se prekoračiti preporučena dnevna doza.

Oligogal[®] Zn + vitamin C kapsule ne smeju koristiti osobe alergične na bilo koji sastojak proizvoda.

Oligogal[®] Zn + vitamin C kapsule ne treba uzimati istovremeno sa dijetetskim proizvodima koji sadrže kalcijum, gvožđe i/ili bakar. Ove proizvode i Oligogal[®] Zn + vitamin C kapsule treba uzimati u razmaku od najkraće 2 sata.

Žene u periodu trudnoće i dojenja Oligogal[®] Zn + vitamin C kapsule mogu koristiti samo posle konsultacije sa svojim lekarom.

Boja E 104 može nepovoljno da utiče na aktivnost i pažnju kod dece.

Interakcije sa lekovima

Cink može da smanji terapijski efekat tetraciklina (npr. doksiciklina) i hinolona (npr. ciprofloksacina).

Da bi se izbegle interakcije lekova i cinka, Oligogal[®] Zn + vitamin C kapsule treba uzimati najmanje 2 sata pre ili posle uzimanja navedenih lekova.

Način čuvanja

Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju.

Čuvati van domašaja dece

Rok upotrebe

3 godine.

Ne sme se koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Pakovanje

30 kapsula



11080 Beograd, Batajnički drum b.b.